

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

GRUPO QUÍMICO: BOTRAN® 75 WP, fungicida de contacto en base a diclorán perteneciente al grupo químico de las nitroanilinas. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la manipulación del concentrado sólido usar delantal impermeable, protector facial, guantes de goma y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek®, protector facial, guantes de goma y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

BOTRAN® 75 WP, es ligeramente tóxico para aves. Moderadamente tóxico para peces y microcrustáceos acuáticos. Virtualmente no tóxico para abejas.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS

LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA LA ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO

Antídoto: No posee antídoto específico.

Tratamiento medico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático

Primeros auxilios: *En caso de contacto con la piel:* lavar con abundante agua de la llave, la zona de cuerpo que haya entrado en contacto con el producto. *En caso de contacto con los ojos:* lavar los ojos con agua fría y corriente, por al menos 15 minutos. *En caso de inhalación:* trasladar al afectado al aire libre. Mantenerlo en reposo. *En caso de ingestión:* administrar 2 tazas de agua y NO PROVOCAR VOMITO. *En todos los casos* trasladar al servicio hospitalario más cercano.

Síntomas de intoxicación: Irritación cutánea y ocular, irritación de las vías respiratorias, tos, náusea, vómitos. **EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD**

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS

Teléfonos de Emergencia: (56) 2 - 2635 38 00 Centro de Información Toxicológica (Atención las 24 horas).

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL

Conserve **BOTRAN® 75 WP**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave.

No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

BOTRAN® 75 WP

FUNGICIDA POLVO MOJABLE (WP)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2016

BOTRAN® 75 WP, fungicida con acción de contacto, recomendado para el control de las enfermedades descritas en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN

Dicloran * 75 %p/p (750 g/kg)

Coformulantes c.s.p. 100 %p/p (1 kg)

* 2,6-dicloro-4-nitroanilina

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Lote: Vencimiento:

Contenido neto:

NO INFLAMABLE • NO CORROSIVO • NO EXPLOSIVO

CONTENIDO NETO:

**FABRICADO POR
GOWAN COMPANY**
P.O. Box 5569
ESTADOS UNIDOS

**DISTRIBUIDO POR
AGROTECHNOLOGY S.A**
Camino Internacional 1421.
Viña del Mar.

Agro technology
potenciando lo natural

Una empresa:

Gowan

INSTRUCCIONES DE USO

BOTRAN® 75 WP, fungicida de contacto recomendado para el control de las enfermedades mencionadas en el cuadro de instrucciones de uso en los cultivos indicados en el mismo cuadro.

Instrucciones de uso:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS		OBSERVACIONES	CARENCIA (días)
		g/100l de agua	Kg/ha		
Vides	Botritis, Pudrición ácida (<i>Botrytis cinerea</i>) (<i>Penicillium</i> sp., <i>Aspergillus</i> sp., <i>Rhizopus</i> sp., <i>Cladosporium</i> sp., <i>Mucor</i> sp.)	200-250	3,0-3,5	Aplicar desde floración hasta precosecha, cuando existan condiciones favorables a la enfermedad	3
Duraznero Nectarino Ciruelo Cerezo	Botrytis, Monilia (<i>Monilia laxa</i>), Sclerotinia, Rhizopus	175-200 120-175	3,5-4,0	En floración aplicar desde botón floral en adelante, según la especie frutal y la localidad. Repetir a los 8-10 días en caso de lluvias. Aplicación de post-cosecha en ducha, por inmersión, o mezclado con cera.	Duraznero y Nectarino: 0. Ciruelo y Cerezo: 20
Frutilla	Botritis, Sclerotinia	300-350	3,5	Iniciar aplicaciones con 2 o 4 flores abiertas. Repetir a los 10 días o de acuerdo a las condiciones predisponentes. No aplicar más de 2 veces en la temporada.	Frutilla 14
Lechuga, Cebolla, Ajo, Zanahoria y Pepino	Botritis Sclerotinia	300-400	2,5	Aplicar al existir condiciones favorables para la enfermedad. Repetir a los 7 - 10 días, mojando bien las plantas.	Cebolla, Ajo y Zanahoria: 7. Lechuga 14; Pepino 21
Flores y Cultivos Ornamentales		100-200			N.C.

Instrucciones de uso:

- En un programa de tratamientos se recomienda alternar con fungicidas de distinto modo de acción, para controlar el eventual desarrollo de cepas resistentes.
- En aplicaciones de postcosecha de fruta para embalaje o industrialización, no hacer recircular la solución que se aplica en la línea de embalaje.
- Usar dosis menor con baja presión de la enfermedad y dosis mayor con presiones medias a altas.
- Aplicar un máximo de 2 veces por temporada con un intervalo mínimo de 8 días entre una aplicación y otra.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque del equipo aplicador con la mitad del agua que va a utilizar, agregar la dosis deseada de **BOTRAN®75 WP** y completar con agua hasta el volumen requerido, manteniendo agitación constante.

Compatibilidad: **BOTRAN®75 WP** es compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas de uso común. No mezclar con insecticidas organofosforados en forma de concentrados emulsionables (EC).

Fitotoxicidad: No presenta en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta. En algunas variedades de Vid se puede presentar un ligero bronceado en las hojas más expuestas al sol, sin embargo, no afecta finalmente los rendimientos en cosecha.

Tiempo de reingreso: 12 horas para ingresar al sector tratado, sin equipo de protección personal. No corresponde reingreso de animales ya que los cultivos en los que se recomienda no tienen como objetivo la alimentación animal.



CUIDADO

