

Descripción

Bioestimulante mejorador de la nutrición, calidad y condición de la fruta. Compuesto por calcio complejado (Óxido de calcio complejado con lignosulfonato: 20,00 %) de rápida acción y disponibilidad.

Formulación de fácil inyección en sistemas de riego presurizados, sin riesgo de taponamiento de goteros.

Producto NO autorizado para su uso en agricultura orgánica

Información

Contenido	Óxido de calcio complejado con lignosulfonato
Concentración (p/v)	Óxido de calcio complejado con lignosulfonato: 20,00 %
Formulación	Concentrado soluble (LS)
Forma de aplicación	Riego al suelo
Clasificación	Bioestimulante
Fabricante	Agroindustrial Kimatec S.L. Edificio MAAVi Innovation Center: Paraje Cerro de los Lobos s/n 04738, Vúcar, España. Tel.: +349503469009. www.kimatecgroup.com
Distribuidor en Chile	Gowan Chile SpA, Riñihue 2450, Bodegas 25 / 26, Los Pinos, Viña del Mar. Tel.: (+56 - 32) 286 0698. www.gowan.cl

Instrucciones de uso

Cultivos	Dosis (L/ha)	Recomendaciones
Frutales	20-40	Aplicar durante crecimiento activo de la planta o periodos de alta demanda (brotación, flor, cuaja, pinta). Dividir dosis en 2 en caso de suelos arenosos y/o pedregosos.
Hortalizas	10-20	Inicio de aplicaciones desde trasplante.

Preparación de la aplicación

- 1) Agregar agua al estanque de fertilización hasta un 50% del total.
 - 2) Agitar enérgicamente contenido del envase.
 - 3) Verter dosis a aplicar en estanque de fertilización.
 - 4) Agregar agua el estanque de fertilización hasta un 80% del total.
 - 5) Agitar por 5 minutos.
 - 6) Inyectar solución.
-

Forma de aplicación

Inyectar en el último tercio del tiempo de riego, dejando tiempo suficiente para la limpieza de cañerías. CALCICROP debe aplicarse con suelo húmedo para lograr la mejor conducción de la mezcla en el suelo.

Número de aplicaciones por temporada

Variable. Consultar con equipo técnico a través de representante de ventas.

Precauciones

Incompatibilidades y fitotoxicidad

CALCICROP no debe mezclarse con otros productos en sistemas de fertirrigación. Una vez aplicado el producto deben lavarse bien con agua los sistemas de goteo y/o inyección con el fin de evitar posibles obstrucciones de los sistemas de riego.

No existen antecedentes de fitotoxicidad ni en especies ni en variedades si se aplica CALCICROP de acuerdo con las recomendaciones vertidas en su etiqueta.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar bajo llave y con temperaturas menores a 30°C.

Parámetros de calidad de CALCICROP

pH:	1,5-3,5
Densidad:	1,34 g/cc
Solubilidad:	100 %
Cadmio (Cd):	< 5,00 mg/kg
Arsénico (As):	< 5,00 mg/kg
Plomo (Pb):	< 5,00 mg/kg
Mercurio (Hg):	< 5,00 mg/kg

Información de seguridad

En caso de intoxicación o de ingesta accidental, llame al CITUC, Centro de Información Toxicológica de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Tel.: +562 2635 3800.
