

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

GRUPO QUÍMICO: aceite de ajo pertenece al grupo químico organosulfurados que tienen grupos alilos y oleorresina de Capsicum pertenece al grupo químico compuestos nitrogenados de origen vegetal

Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel y ojos. **Durante la preparación** del producto usar guantes impermeables, botas de goma impermeables, overol impermeable, máscara con filtro y antiparras. **Durante la aplicación** usar como protección, guantes impermeables, botas de goma impermeables, overol impermeable, mascara con filtro y antiparras. No comer, beber o fumar durante el uso del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua fría las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

ALMACENAJE: Almacenar bajo llave, en lugar fresco y seco, en su envase original bien cerrado. No lo exponga al calor o llama. No almacenar junto con alimentos, forrajes ni semillas.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Puede producir irritación ocular. Puede causar una reacción alérgica en la piel de individuos sensibles.

PRIMEROS AUXILIOS: En todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo. **En caso de contacto con la piel:** retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. Si hay irritación, contacte a un médico. **En caso de contacto con los ojos:** lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Si hay irritación, consulte a un médico. **En caso de ingestión: NO PROVOCAR EL VÓMITO.** Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. **En caso de inhalación:** sacar al afectado al aire fresco. En caso de molestia, consulte a un médico. Si la persona no respira, otorgar respiración artificial.

TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA: Realizar tratamiento sintomático. **Antídoto:** No tiene antídoto específico.

EN CASO DE INGESTIÓN O INTOXICACIÓN LLAMAR AL (2) 2635 3800,
CONVENIO CITUC O AL (2) 2247 3600 CITUC EMERGENCIAS QUÍMICAS, EN
CASO DE ACCIDENTE. TELÉFONOS DE EMERGENCIA - ATENCIÓN LAS 24
HORAS.
CONSULTAS GOWAN CHILE S.P.A: +5632 2860 698

Información Ecotoxicológica: Prácticamente no toxico para aves, peces y micro crustáceos. Levemente tóxico para algas. Ligeramente tóxico para abejas. Dentro de la formulación existe componente que posee efectos tóxicos y perjudiciales para la vida acuática, con efectos duraderos.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.
LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.**

REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

**NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.
NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO**

Instrucciones para triple lavado: Realice el triple lavado inmediatamente después de vaciado el envase; agregue agua hasta ¼ de su capacidad, cierre y agite durante 30 segundos y vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Realice este procedimiento 3 veces. Posteriormente, perforo el envase para evitar su reutilización y entréguelo en centros de acopio autorizados.

CAPTIVA® PRIME

INSECTICIDA-ACARICIDA-REPELENTE CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición

Aceite de ajo (<i>Allium sativum</i>)*	23,4 % p/p (220 g/L)
Oleorresina de Capsicum (<i>capsicum annum</i>)**	7,6 % p/p (72,2 g/L)
Coformulantes, c.s.p	100 % p/v (1L)

* contenido mínimo de compuestos azufrados.....7,7 g/kg

**contenido mínimo de capsaicina.....2,5 g/kg

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 1952

CAPTIVA® PRIME es un insecticida, acaricida y repelente de origen natural, que actúa por contacto, tiene un amplio espectro de control y controla las plagas indicadas en el Cuadro de Instrucciones de uso.

N° Lote

Fecha de vencimiento:

Contenido Neto:

**NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Formulador:

Ecoflora AgroFormulaciones S.A.S. Zona franca de Rionegro, bodega 238, Vereda Chachafruto Rionegro, Colombia



Importador y distribuidor

Gowan Chile S.p.A - Riñihue 2450 B25 - B26, Los Pinos, Reñaca, Viña del Mar, Chile.



CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO:

CAPTIVA® PRIME protege los cultivos del establecimiento de poblaciones de plagas por sus propiedades anti-alimentarias y anti-oviposición. El efecto irritante de CAPTIVA PRIME aumenta la movilidad de las plagas, su exposición y vulnerabilidad a los insecticidas o acaricidas que actúan por contacto. CAPTIVA PRIME debilita la cutícula de algunos estados inmaduros de plagas de insectos y ácaros, sumando además un efecto de repelencia.

Cuadro de Instrucciones de Uso:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	ÉPOCAS DE APLICACIÓN
Vid de mesa, vinífera y pisquera	Araña roja (<i>Oligonychus vitis</i>)	150 a 200 cc/hL	Aplicar a follaje entre brotación y cosecha. Repetir cada 7 a 10 días, con un máximo de 5 aplicaciones por temporada, idealmente no consecutivas entre sí. Mojamiento 1.500 litros de agua por hectárea. Se recomienda utilizar la dosis más alta para asegurar un control eficaz bajo condiciones de alta presión de plaga o cuando se anticipa una rápida reinfestación
	Trips de California (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	150 a 200 cc/hL	Aplicar a follaje entre floración y cosecha. Repetir cada 7 a 10 días, con un máximo de 5 aplicaciones por temporada, idealmente no consecutivas entre sí. Mojamiento 1.500 litros de agua por hectárea. Se recomienda utilizar la dosis más alta para asegurar un control eficaz bajo condiciones de alta presión de plaga o cuando se anticipa una rápida reinfestación
limoneros, mandarinos, tangerinos, naranjos, kumquats, clementinos y pomelos	Mosquitas blancas (<i>Aleurothrixus floccosus</i> , <i>Dialeurodes citri</i>) Ácaro de las yemas (<i>Aceria sheldoni</i>)	150 a 200 cc/hL	Para mosquitas blancas aplicar a follaje cuando el 25% de las hojas presenten ninfas, repitiendo cada 10 a 14 días Máximo de 3 aplicaciones por temporada, idealmente no consecutivas entre sí. Mojamiento 1.500 litros de agua por hectárea. Para ácaro de las yemas aplicar a follaje, previo a brotación y floración, repitiendo cada 7 a 10 días. Se recomienda utilizar la dosis más alta para asegurar un control eficaz bajo condiciones de alta presión de plaga o cuando se anticipa una rápida reinfestación
Arándanos	Mosca de alas manchadas (<i>Drosophila suzukii</i>)	150 cc/hL	Aplicar a follaje repitiendo cada 7 días, hasta 2 aplicaciones por temporada idealmente no consecutivas entre sí. Aplicar de acuerdo con monitoreo mientras exista presencia de adultos, con especial énfasis previo a pinta y en post-cosecha. Mojamiento : 800 litros de agua por hectárea.
Manzanos	Pulgón lanígero del manzano (<i>Eriosoma lanigerum</i>)	1,5 – 2.0 L/há	Aplicar, de acuerdo con monitoreo, al inicio de migración de ninfas hacia los frutos. Aplicar como máximo en 4 oportunidades por temporada con intervalos cada 14 días, idealmente alternando con productos de otros grupos químicos Se recomienda utilizar la dosis más alta para asegurar un control eficaz bajo condiciones de alta presión de plaga o cuando se anticipa una rápida reinfestación. Mojamiento 1.500 litros de agua por hectárea
durazneros, cerezos, nectarinos, ciruelos	araña roja europea (<i>Panonychus ulmi</i>) y araña bimaculada (<i>Tetranychus urticae</i>)	150-200 cc/hL	Aplicar a follaje de acuerdo a monitoreo, con poblaciones en umbrales críticos. Realizar máximo dos aplicaciones por temporada, alternadas en 14 días con acaricidas de distintos mecanismos de acción. Se recomienda utilizar la dosis más alta para asegurar un control eficaz bajo condiciones de alta presión de plaga o cuando se anticipa una rápida reinfestación. Mojamiento: 1.500 litros de agua por hectárea.
Cerezos	Mosca de alas manchadas (<i>Drosophila suzukii</i>)	150 cc/hL	Aplicar a follaje repitiendo cada 7 días, con un máximo de 2 aplicaciones por temporada idealmente no consecutivas entre sí. Aplicar de acuerdo a monitoreo mientras exista presencia de adultos, con especial énfasis previo a pinta. Mojamiento: 1.500 litros de agua por hectárea.
Avellanos europeos	Chinche pardo (<i>Leptoglossus chilensis</i>)	1.5 L/há	Aplicar de acuerdo a monitoreo, al detectarse primeros individuos sobre el follaje repitiendo cada 7 días, 3 aplicaciones por temporada Mojamiento : 1.200 a 1.500 litros de agua por hectárea.

PREPARACIÓN DE LA ASPERSIÓN: Llene el estanque hasta la mitad, haga una premezcla con la cantidad de **CAPTIVA® PRIME** necesaria y agitando complete el volumen de agua necesario.

PERÍODO DE CARENCIA (días): 0 días

FITOTOXICIDAD: No presenta en los cultivos en los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Compatible físicamente con Suspensiones concentradas, Granulados dispersables, Polvos mojables, Concentrados solubles y Concentrados emulsionables.

INCOMPATIBILIDAD: No presenta incompatibilidad con agentes oxidantes o reductores

TIEMPO DE REINGRESO: Esperar 4 horas después de realizada la aplicación, para reingresar personas ó animales al área tratada.

Condiciones en que el producto puede o no ser utilizado: No aplicar en presencia de lluvia o cuando exista probabilidad de ello en las 3 horas posteriores a la aplicación. No aplicar cuando la temperatura sea mayor a 30°C. No aplicar cuando la velocidad del viento sea mayor a 10 Km/h.Se garantiza la calidad y contenido del ingrediente activo señalado en esta etiqueta hasta que el producto salga de su control directo. Debido a que la acción de un plaguicida puede resultar influenciada por diversos factores, no se asume responsabilidad alguna por eventuales daños de cualquier naturaleza, derivadas de su uso, manipulación o almacenaje.

