

## Descripción

Protección natural para cintas de riego. Bioestimulante hecho a partir de preparados biodinámicos que no deja residuos, no tiene días de carencia, riesgos en la aplicación o consumo. Uso valido para todo tipo de hortalizas y frutales.

Producto AUTORIZADO para su uso en agricultura orgánica.

## Información

Contenido	Extractos vegetales.
Concentración (mg/L)	Diente de León: 2,28 mg/L Manzanilla: 2,28 mg/L Milenrama: 2,28 mg/L Ortiga: 2,28 mg/L Roble: 2,28 mg/L
Formulación	Líquido soluble (LS).
Forma de aplicación	Riego.
Clasificación	Bioestimulante.
Fabricante	Presidente Riesco 6685, Las Condes, Santiago. Chile. Tel.: (+56) 9 50056702 inuit@ecosuelo.cl
Distribuidor en Chile	Gowan Chile SpA, Riñihue 2450, Bodegas 25 / 26, Los Pinos, Viña del Mar. Tel.: (+56 - 32) 286 0698. www.gowan.cl

## Instrucciones de uso

Uso	Dosis	Recomendaciones
Protección de sistemas de riego	500 cc/ha	Inyectar a través de riego por goteo o aspersión con buena cobertura.
	ó 2 cc/l	Para superficies menores a 1 ha

### **Preparación de la aplicación**

---

- 1) Agregar agua al estanque de fertilización, hasta un 30% del total.
  - 2) Agitar enérgicamente contenido del envase.
  - 3) Verter dosis a aplicar en estanque de fertilización.
  - 4) Agregar agua el estanque de fertilización, hasta un 100% del total.
  - 5) Agitar por 5 minutos.
  - 6) Inyectar solución según sea el caso.
- 

### **Forma de aplicación**

---

- 1) Realizar una aplicación inicial (día 1).
  - 2) Segunda aplicación 7 días después.
  - 3) Tercera y cuarta aplicación cada 10-12 días.
  - 4) Luego de la 4ta aplicación, esperar 10-12 días y aplicar producto "Bd" que viene incluido (aplicar solo, no en mezcla con Drip Safe).
  - 5) Pasadas 24-48 h, comenzar con aplicaciones de Drip Safe (desde el punto 1) de ser necesario.
- 

### **Número de aplicaciones por temporada**

---

Variable según el tiempo de protección deseado. Consultar con equipo técnico a través de representante de ventas.

---

### **Precauciones**

---

#### **Incompatibilidades y fitotoxicidad**

No se recomienda mezclar DRIP SAFE con otros productos en sistemas de fertiirrigación.

No mezclar DRIP SAFE con productos en base a cobre, cloruros y/o productos con actividad bactericida.

Una vez aplicado el producto deben lavarse bien con agua los sistemas de goteo y/o inyección con el fin de evitar posibles obstrucciones de los sistemas de riego.

No existen antecedentes de fitotoxicidad ni en especies ni en variedades si se aplica DRIP SAFE de acuerdo con las recomendaciones vertidas en su etiqueta.

#### **Condiciones de almacenamiento**

Almacenar en un lugar oscuro, bajo llave y con temperaturas menores a 30°C

---

### **Parámetros de calidad de DRIP SAFE**

---

pH: 6-7  
Densidad: 1,14 g/cc  
Solubilidad: 100 %  
Cadmio (Cd): < 0,50 mg/kg  
Arsénico (As): < 11,00 mg/kg  
Plomo (Pb): < 5,00 mg/kg  
Mercurio (Hg): < 0,50 mg/kg

---

### **Información de seguridad**

---

En caso de intoxicación o de ingesta accidental, llame al CITUC, Centro de Información Toxicológica de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  
Tel.: +562 2635 3800.

---